

Conducta Suicida en Zonas Extremas



Ministerio de
Salud

Dr. Matías Irarrázaval
Ps. María Paz Araya
Ministerio de Salud

Marzo 2019

Gobierno de Chile

Suicidio: hechos y datos

El **suicidio** es la **segunda** causa de defunción entre las personas de **15 a 29** años



Más de **800 000** personas se **suicidan** cada año

Una muerte cada **40** segundos



Países de altos ingresos



La mortalidad por **suicidio** es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios




Los **plaguicidas**, el **ahorcamiento** y las **armas de fuego** son los métodos más habituales empleados en el mundo

Fuente: OMS


En comparación a la tasa de suicidio de los países pertenecientes a la OCDE, Chile se encuentra por debajo del promedio con una tasa de 10, 2 por cada 100 mil hbtes.

3.15. Suicide, 2015 (or nearest year)




1. Three-year average.
Source: OECD Health Statistics 2017.

Chile y tasas de mortalidad en países de la región de las Américas



No somos líderes mundiales
ni regionales en suicidio!!

Tasa de Mortalidad por lesiones autoinflingidas, en población general entre los años 2000 y 2016



La proporción de suicidio entre mujeres y hombres es de 1 a 5




Datos DEIS 2016

En Chile

1800 personas mueren
por suicidio cada año en
Chile


**3 regiones
concentran
el 55% de las
muertes
por suicidio**




En Chile el
ahorcamiento, las
armas de fuegos y el
envenenamiento
son los métodos
más empleados



Tasa de mortalidad por suicidio años 2000, 2008 y 2016, según región



Tasa de mortalidad suicidio por región y sexo. Chile 2016




Región de Residencia /sexo	2016		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
País	10,2	17,1	3,4
Región de Arica y Parinacota	8,6	14,7	2,5
Región de Tarapacá	10,4	15,7	4,8
Región de Antofagasta	7,9	13,0	2,3
Región de Atacama	11,4	17,7	4,6
Región de Coquimbo	10,2	17,5	3,0
Región de Valparaíso	11,0	19,2	3,0
Región Metropolitana de Santiago	9,1	14,6	3,8
Región del Libertador Bernardo O'Higgins	11,0	17,8	4,1
Región del Maule	11,9	20,6	3,4
Región del Bío-bío	9,6	17,5	2,0
Región de La Araucanía	12,9	23,9	2,2
Región de Los Ríos	5,7	9,4	1,9
Región de Los Lagos	27,3	42,7	11,8
Región de Aisén del Gran Chileno	20,1	35,2	3,8
Región Magallanes y la Antártica Chilena	9,1	14,1	3,7

Algunos análisis de zonas extremas


Región Arica y Parinacota

Defunciones por Suicidios (X60 a x84) 2014 a 2018 Región de Arica y Parinacota




* Información Preliminar

Defunciones por Suicidios (X60a x84) 2014 a 2018, según sexo, Región de Arica y Parinacota




* Información Preliminar

Mortalidad Según Edad, Años 2014 a 2018



Mortalidad Según Método, Años 2014 a 2018

Defunciones por Suicidios según método, 2014 a 2018
Región de Arica y Parinacota



Caracterización grupo de riesgo según vigilancia de intentos de suicidio

- **Masculino 30,6% y Femenino 69,4%**
- **54% Notificaciones = grupo 10 a 19 años**
- **grupo 10 a 19 años = 75% femenino y 25% masculino**
- **16 años (20% del grupo etario de 10 a 19 años)**
- **Estudiantes**
- **Educación Media Incompleta**
- **Método más utilizado envenenamiento por Drogas y Medicamentos**
- **Presentan Intentos Previos**
- **Presentan Consumo de Drogas**

Región Tarapacá


Región Los lagos

CUADRO COMPARATIVO SUICIDIOS V/S INTENTOS DE SUICIDIO, REGION DE LOS LAGOS

SUICIDIOS CONSUMADOS (Datos SML) Período entre 2016 y 2017.	INTENTOS DE SUICIDIO (datos sistema vigilancia regional) 468 casos entre 2015 y 2017:
214 casos.	74%
86% = ahorcamiento, estrangulación y sofocación	68% = solo ingesta / intoxicación farmacológica
6% = arma de fuego	6% = ingesta / intoxicación farmacológica + otros:
14% = otros metodos	consumo de alcohol
farmacos = 0%	objeto cortante
	sustancias químicas
	26% = otros metodos

Región AYSÉN

Tasa de Mortalidad por Suicidio. Región de Aysén 2000-2016



CUADRO COMPARATIVO SUICIDIOS V/S INTENTOS DE SUICIDIO AÑO 2018, REGION DE AYSEN

SUICIDIO	INTENTOS SUICIDIO
14 eventos suicidio consumado en total	39 notificaciones en total provenientes desde la red asistencial
Promedio edad: Hombres 45 años Mujeres 29 años	Promedio edad Hombres 28 años Mujeres 26 años
Concentración de casos consumados en segmento 30 y 50 años	Concentración de casos entre los 12 a los 20 años
Rango de edad entre los 17 años y 93 años	Rango edad de intentos entre los 7 y 71 años.
Joven de 17 años primer suicidio durante años 2016,2017,2018,2019	Al momento continuamos sin suicidio juvenil
Método utilizado. 90% asfixia por ahorcamiento	Método de mayor recurrencia intoxicación (70%), seguido por lanzamiento desde las alturas y autolesiones ((ambas un 30%)
Concentración de eventos en meses de octubre y noviembre	Concentración de los eventos en meses de Abril-agosto-septiembre-octubre
Distribución del evento consumado según sexo 21% mujeres y un 79% hombres.	Distribución del evento en un 51% en mujeres y un 49% en varones

FACTORES PROTECTORES

Suicidios consumados	Intentos de suicidio
-Redes de apoyo institucionales presentes	-Sensibilización permanente a sectores de mayor riesgo (personas mayores, jóvenes, EE)
-Intervenciones tempranas preventivas sectorizadas (trabajo, comunas, EE, JJVV)	-Abordaje en los Establecimientos Educativos permanente
-Seguimiento a familias y/o entorno con algún integrante con suicidio consumado	-Entrega de herramientas básicas a la población para detectar tempranamente factores de riesgo y brindar apoyo

FACTORES DE RIESGO

En suicidios consumados	En intentos de suicidio
-Antecedentes de consumo problemático de alcohol	-Consumo de alcohol
-Antecedentes de conflictos de pareja	-Deserción escolar
-precariedad laboral	-vínculos precarizados a nivel familiar
-Escolaridad precaria	-curso de vida (adolescencia y personas mayores)


Región MAGALLANES

Punta Arenas

Cuadro comparativo Suicidios v/s intentos suicidio, Región de Magallanes y Antártica Chilena, año 2018

Suicidio	Intento de suicidio
16 casos	238 notificaciones / 215 personas
Más frecuente en hombres (12/16), 75%	Más frecuentes en mujeres (68% de notificaciones corresponden a mujeres)
Más casos entre 20-29 años (38%)	Más casos entre 20 a 29 años.
Rango de las edades entre 19-75 años.	Rango de las edades 10 a 77 años.
Método utilizado asfixia por ahorcamiento 94% (15/16)	Método más utilizado ingesta de fármacos 69.7%
Promedio de 1,3 casos mensuales	Promedio de 20,58 casos mensuales
Mayor número de casos en el mes de marzo y agosto	Mayor número de casos en mayo y julio.

Distribución porcentual de los suicidios consumados, según comuna de ocurrencia, Región de Magallanes y Antártica Chilena, 2018.



Gracias



**Ministerio de
Salud**

Gobierno de Chile