Criterios para considerar que paciente COVID19 deja de ser infectante[†]	
I.- CRITERIOS CLINICOS	
SITUACION DEL PACIENTE	CRITERIO
1. Casos leves manejados en domicilio sin síntomas al día 14 desde el inicio de síntomas.	14 días desde la fecha en que inició los síntomas de la enfermedad; si no está clara fecha de inicio síntomas, usar fecha de diagnóstico.
2. Pacientes hospitalizados, que fueron dados de alta sin síntomas	
3. Pacientes hospitalizados, que fueron dados de alta, que están sin fiebre, pero mantienen síntomas respiratorios residuales	14 días desde el alta del hospital
4. Personas con compromiso de su sistema inmune*	28 días desde la fecha de inicio de síntomas
II.- CRITERIOS DE LABORATORIO^{&} (Son complementarios a los criterios clínicos, son deseables, pero no indispensables)	
Detección de anticuerpos en sangre	Resultado IgG positivo en examen tomado a partir del día 7 desde la fecha de inicio de síntomas (o del diagnóstico si se desconoce fecha inicio de síntomas).

[†]Estos criterios están consensuados por el Comité Asesor COVID 19 del MINSAL, en base a la información disponible hoy en día, serán revisados periódicamente de acuerdo con el avance del conocimiento y las técnicas de detección del virus o evaluación de la respuesta inmune del huésped. Se aplican a los casos confirmados, de acuerdo con las normativas del Ministerio de salud.

*Compromiso del sistema inmune: persona con sistemas inmunológicos afectados por enfermedades de base o factores externos (tratamientos inmunosupresores). Incluye sujetos con: infección por VIH sin control adecuado (carga viral detectable y recuento de linfocitos T CD4+ <200 mm³), neoplasias sólidas y hematológicas con o sin tratamiento, usuarios de fármacos biológicos (anticuerpos monoclonales), y usuarios de corticoides en dosis inmunosupresoras (prednisona 20 mg/d por al menos 14 días o sus equivalentes).

[&]Examen RT_PCR: Se desestimó su utilidad como criterio de no infectante, dado que la literatura reciente ha demostrado que los pacientes dejan de tener partículas virales infectantes en las muestras de vía respiratoria superior a los 7 a 10 días desde el inicio de los síntomas. Sin embargo, el examen de RT-PCR continuará positivo por varios días o semanas, sin ser necesariamente un marcador de infectividad. Se recomienda reservar el Rt-PCR para el diagnóstico clínico al inicio de los síntomas, donde es el principal examen diagnóstico de la enfermedad.