

# Manejos para evitar larvas de *Drosophila suzukii* en Berries



La agroindustria está realizando control estricto de la presencia de larvas y puede rechazar la fruta infestada.

1. Cosechar de forma frecuente, idealmente cada día.


2. Evitar que caiga fruta al piso.


3. Limpiar el huerto después de cada cosecha.


4. Manejar (eliminar) hospederos en los contornos del huerto.


5. Podar para favorecer la iluminación y aireación de las plantas.


6. Usar mulch.


7. Preferir riego tecnificado.


8. Ampliar marcos de plantación.


9. Realizar trampeo masivo.


10. Usar insecticidas autorizados por SAG y de acuerdo a los mercados de destino.





- Favorecen a la plaga:
- Sectores húmedos, poco ventilados y poco soleados.
  - Malezas.
  - Fruta en el suelo y en los contornos.

Fotografía: Oscar Avendaño

La fruta es más susceptible a la mosca desde la pinta a la cosecha.

El insecto completa su ciclo cada 7-10 días



Si tiene dudas comuníquese con su Asesor Técnico

INDAP  
Ministerio de Agricultura

Chilealimentos®

Comfrut  
Safety Always

Olmue

vitafoods

Watt's

UNA INICIATIVA DE

MÁS INFORMACIÓN EN

